

# 健診結果表のみかた

## 特定基本健診のみかた

特定基本健診の結果は、自覚症状のない生活習慣病の早期発見につながるとともに、日頃の生活習慣を反映していますので、生活を見直す指標になります。「健診結果表」と「結果表のみかた」をよく読み、今後の健康づくりに活かしてください。

### ●検査の意味

| 項目  |             | 意味  |
|-----|-------------|---|
| 体格  | BMI (体格指数)  | 医学的に最も病気のリスクが少ない「BMI=22」を「適正体重」としています。  |
|     | 腹囲          | おへそ周りの大きさは、内臓脂肪がどの程度蓄積しているのかの目安となり、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の判定の指標となります。<br>(注)75歳以上の方は測定しない場合があります。  |
| 脂質  | 中性脂肪        | 皮下脂肪の主成分です。糖質やアルコールの摂りすぎで増加しやすく、動脈硬化の原因になります。食事時間や食事内容によって数値が高くなる場合があります。   |
|     | HDLコレステロール  | HDL(善玉)コレステロールは、血管壁にたまった余分なコレステロールを回収して肝臓に戻し、動脈硬化を予防します。  |
|     | LDLコレステロール  | LDL(悪玉)コレステロールは、全身の細胞にコレステロールを運びます。増えすぎると血管壁に沈着し、動脈硬化を進めます。   |
|     | 総コレステロール    | コレステロールは、体の細胞を作るのに必要な成分です。多すぎると動脈硬化の原因となります。甲状腺機能低下により上昇する場合があります。肝臓病や栄養障害などで低くなります。  |
| 血圧  | 血圧          | 最高(収縮期)血圧は心臓が収縮して血液が全身に送り出された時の圧力、最低(拡張期)血圧は心臓が拡張して血液が心臓に戻る時の圧力です。<br>高血圧の状態が続くと動脈硬化を招き、心筋梗塞や脳卒中の原因となります。                                 |
| 糖尿病 | 尿糖          | 尿に含まれるブドウ糖です。陽性では糖尿病や腎性糖尿などが疑われます。  |
|     | 血糖          | 血液に含まれるブドウ糖の量です。高値では糖尿病が疑われます。食後は血糖値が上昇します。   |
|     | HbA1c       | 過去1~2か月間の血糖値の平均値を示しています。<br>採血直前の食事に影響されないで糖尿病の指標になります。   |
| 尿酸  | 血清尿酸        | 血液中の尿酸の量を示しています。高値では痛風や動脈硬化の原因となります。  |
| 心電図 | 心電図         | 心臓の拍動に伴う電気的な活動の変化を波形にしたものです。<br>不整脈や心筋梗塞などを調べます。  |
| 眼底  | 眼底          | 眼底の血管を直接観察することで、全身の血管の状態を調べる検査です。動脈硬化・高血圧・糖尿病など全身疾患による血管の変化を各分類の進行度(0~4)で表しています。<br>(注)眼底検査の結果、出血を認める場合、「検査についての連絡事項」の欄に記載がありますのでご確認ください。 |
| 腎臓  | 尿蛋白         | 血液中の蛋白が尿に出てきたものです。<br>陽性では腎炎やネフローゼなどの腎臓疾患が疑われます。  |
|     | 尿潜血         | 尿中に混じる血液です。陽性では腎臓・尿管・膀胱・尿道・前立腺などの疾患が疑われます。  |
|     | 尿素窒素        | 体の老廃物の一つで、腎臓から尿に排出されます。高値では腎臓疾患が疑われます。脱水などでも軽度上昇します。  |
|     | 血清クレアチニン    | 体の老廃物の一つで、腎臓から尿に排出されます。高値では腎臓疾患が疑われます。  |
|     | eGFR濾過量     | 腎臓がどれくらい老廃物を尿へ排泄する能力があるかを表します。低値では腎機能の低下が疑われます。<br>(注)血清クレアチニン値と年齢、性別から計算式によって算出される値です。   |
| 貧血  | 血色素量        | 血色素には酸素を全身に運ぶ役割があります。<br>低値では貧血、高値では多血症が疑われます。  |
|     | ヘマトクリット値    | 血液中に占める赤血球の割合を表しています。<br>低値では貧血、高値では多血症が疑われます。  |
|     | 赤血球数        | 血液中の赤血球数を表します。低値では貧血、高値では多血症が疑われます。   |
| 肝臓  | AST(GOT)    | 肝臓・心臓・骨格筋などに多く含まれる酵素です。高値はこれらの臓器の疾患が疑われます。  |
|     | ALT(GPT)    | 肝臓に含まれる酵素です。高値は脂肪肝・肝炎・肝硬変などの肝臓疾患が疑われます。   |
|     | γ-GT(γ-GTP) | 肝臓の解毒作用に関連する酵素で特に飲酒に反応します。<br>高値は脂肪肝や飲酒・薬剤による肝障害・胆道の疾患が疑われます。   |
|     | ALP         | 肝臓・腎臓・骨などに分布する酵素です。高値は肝臓・胆道疾患が疑われます。  |
| 視聴覚 | 視力          | 近視の有無を調べます。   |
|     | 聴力          | 難聴の有無や程度を調べます。  |

●判定基準

判定区分

A:異常認めず

C:要指導(保健指導)

E:要医療(受診勧奨)

F:要継続医療(治療中)

今回の健診の結果、異常は認められませんでしたが、生活習慣病は自覚症状のないまま進行することが多いので、これからも年に1回は健診を受けてください。

今回の健診の結果、軽度の異常が認められます。これから病気の発症あるいは悪化を予防することが大切です。医師・保健師・栄養士などに相談し、生活習慣の改善に努めましょう。

今回の健診の結果、異常が認められます。医師に相談し、生活習慣の改善に努めましょう。

現在医療機関で治療を受けておられますので、引き続き主治医の指示に従ってください。

特定基本健診判定基準値

| 項目        |                                 | 区分                                      | A<br>異常認めず       | C<br>要指導                       | E<br>要医療       | F<br>要継続医療 |  |
|-----------|---------------------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------|------------|--|
| 体格        | BMI(体格指数)<br>(身長・体重)            | 体重(kg)÷身長 <sup>2</sup> (m)<br>の式で計算します。 | 18.5~24.9        | 18.4以下<br>25.0以上               |                |            |  |
|           | 腹囲 cm                           | 男性<br>女性                                | 84.9以下<br>89.9以下 | 85.0以上<br>90.0以上               |                |            |  |
| 脂質        | 中性脂肪 mg/dl                      |   | 30~149           | 29以下・150~299                   | 300以上          |            |  |
|           | HDLコレステロール mg/dl                |   | 40~99            | 35~39・100以上                    | 34以下           |            |  |
|           | LDLコレステロール mg/dl                |   | 119以下            | 120~139                        | 140以上          |            |  |
|           | 総コレステロール mg/dl                  | 男性全員・女性49歳以下<br>女性50歳以上                 | 150~219          | 149以下・220~239<br>149以下・220~259 | 240以上<br>260以上 |            |  |
| 血圧        | 最高(収縮期)血圧 mmHg                  |   | 100~129          | 90~99・130~139                  | 89以下・140以上     |            |  |
|           | 最低(拡張期)血圧 mmHg                  |   | 84以下             | 85~89                          | 90以上           |            |  |
| 糖尿病       | 尿糖                              |   | (-)              | (±)                            | (+)・(2+)・(3+)  |            |  |
|           | 血糖 mg/dl                        | 空腹時                                     | 食後10時間以上         | 60~99                          | 59以下・100~125   | 126以上      |  |
|           |                                 | 随時                                      | 食後10時間未満         | 60~139                         | 59以下・140~179   | 180以上      |  |
|           | HbA1c %                         |   | NGSP値            | 5.5以下                          | 5.6~6.4        | 6.5以上      |  |
| 尿酸        | 血清尿酸 mg/dl                      |   | 6.9以下            | 7.0~7.9                        | 8.0以上          |            |  |
| 心電図       | 心電図所見                           |   | ミネソタコード          | 医師の判定による                       |                |            |  |
| 眼底        | キースワグナー分類                       |   | 00               | 01                             | 2A・2B・03・04    |            |  |
|           | シェイエ分類                          |   | 動脈硬化性変化(S)<br>H0 | S0<br>H0~1                     | S2~4<br>H0~4   |            |  |
| 腎臓        | 尿蛋白                             |   | (-)              | (±)                            | (+)・(2+)・(3+)  |            |  |
|           | 尿潜血                             |   | (-)・(±)          | (+)                            | (2+)・(3+)      |            |  |
|           | 尿素窒素 mg/dl                      |   |                  | 23以下                           | 24~25          | 26以上       |  |
|           | 血清クレアチニン mg/dl                  | 男性                                      | 0.40~1.19        | 0.39以下・1.20~1.39               | 1.40以上         |            |  |
| 女性        |                                 | 0.40~0.99                               | 0.39以下・1.00~1.09 | 1.10以上                         |                |            |  |
|           | eGFR値 ml/min/1.73m <sup>2</sup> |   | 60.0以上           | 45.0~59.9                      | 44.9以下         |            |  |
| 貧血        | 血色素量 g/dl                       | 男性                                      | 13.1~17.9        | 12.1~13.0・18.0以上               | 12.0以下         |            |  |
|           |                                 | 女性                                      | 12.1~15.9        | 11.1~12.0・16.0以上               | 11.0以下         |            |  |
|           | ヘマトクリット値 %                      | 男性                                      | 38.0~54.9        | 35.0~37.9・55.0以上               | 34.9以下         |            |  |
|           |                                 | 女性                                      | 34.0~49.9        | 31.0~33.9・50.0以上               | 30.9以下         |            |  |
| 赤血球数 万/ul | 男性                              | 400~599                                 | 360~399・600以上    | 359以下                          |                |            |  |
|           | 女性                              | 360~549                                 | 330~359・550以上    | 329以下                          |                |            |  |
| 肝臓        | AST(GOT) IU/l                   |   | 30以下             | 31~50                          | 51以上           |            |  |
|           | ALT(GPT) IU/l                   |   | 30以下             | 31~50                          | 51以上           |            |  |
|           | γ-GT(γ-GTP) IU/l                |   | 50以下             | 51~100                         | 101以上          |            |  |
|           | ALP※ IU/l                       |   | 32~122           | 31以下・123~146                   | 147以上          |            |  |
| 視聴覚       | 視力                              |   |                  |                                |                |            |  |
|           | 聴力                              | 1000Hz db                               | 30以下             |                                | 31以上           |            |  |
| 4000Hz db |                                 | 40以下                                    |                  | 41以上                           |                |            |  |

医療機関に受診中

※令和3年度からALPの測定法がJSCC法からIFCC法に変わり、基準値を変更しています。

(注)1.判定区分・判定基準値は厚生労働省および学会が制定した指標に基づき定めています。判定区分については、当健診ではB:軽度異常、D:要精密検査は定めておりません。

(注)2.一部の検査項目は、必要な方のみを実施している場合があります。

メタボリックシンドロームとはおへそ周りに脂肪がたまる内臓脂肪型肥満に加え、高血糖・高血圧・脂質異常のうち2つ以上を伴った状態をいいます。メタボリックシンドロームの状態が続くと、さまざまな生活習慣病にかかりやすくなります。さらに深刻なのは、動脈硬化が急速に進み血管が詰まったり破れやすくなるため、心臓病や脳卒中などの深刻な病気を招いたり、糖尿病の合併症を引き起こしやすくなることです。メタボリックシンドロームを解消することが、深刻な生活習慣病の発症予防につながります。おへそ周りの大きさが増えたら、健康の危険信号ととらえましょう。

## 各検診の検査の意味と判定のしかた

がん対策は早期発見、早期治療が重要です。異常がある場合は、必ず精密検査を受けるようにしましょう。

| 胸部<br>検診         | 胸部を撮影した写真により、結核・肺がん・肺炎など肺と気管支の状態を医師が判定しています。<br>この検診で異常が認められた場合、また自覚症状が気になる場合は必ず内科または呼吸器科を受診し、精密検査を受けてください。   |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
|------------------|---|--|--------|--------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------|------------|-------|-----|--------|---------------|-----------|--------|-------|------|----------|---------------------------------|-------|--------|--|-------|------|--------------------------|---------|---|--------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|---------|------|--------------------|--|--|-------|-------|--|--------|-------|--|--------|-------|--|--|-------|-------|--|
| 喀<br>痰<br>検査     | 顕微鏡で痰の中の細胞を観察し、がん細胞が含まれているかどうかを判定しています。   |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 胃部<br>検診         | バリウムを飲んで胃部を撮影した写真により、胃かいよう・胃がん・胃炎などを医師が判定しています。<br>この検診で異常が認められた場合、また自覚症状が気になる場合は必ず消化器科または内科を受診し、内視鏡検査などの精密検査を受けてください。  |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 大腸<br>検診         | <p>2日間の便をとり、便に血液が混じっていないかを調べます。<br/>人間の血液だけに反応する便潜血反応により判定しています。この検診の結果、便潜血反応が陽性(+)の場合、また自覚症状が気になる場合は必ず消化器科を受診し、内視鏡検査などの精密検査を受けてください。<br/>現在治療中の方は、この結果にかかわらず主治医の指示に従って治療を続けてください。</p> <p>【JA兵庫厚生連実施】</p> <p>○判定基準</p> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">便潜血検査結果 (ng/ml)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td>検査値が150以下の場合には(-)と表示し、検査値は表記していません。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(+)</td> <td>検査値が151以上の場合には(+)と表示し、検査値を表記しています。</td> </tr> </tbody> </table> <p>○判定区分</p> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">判定区分</th> <th colspan="2">便潜血検査結果 (ng/ml)</th> </tr> <tr> <th>1日目</th> <th>2日目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異常認めず1</td> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td style="text-align: center;">(-)</td> </tr> <tr> <td>異常認めず2</td> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td style="text-align: center;">検体なし</td> </tr> <tr> <td>要観察</td> <td colspan="2">結果が2日とも(-)で、問診の内容により医師が必要と認めた場合</td> </tr> <tr> <td>要精密検査</td> <td colspan="2">結果が1日または2日とも(+)の場合<br/>(注)検査値が2日とも150以下でも2日間の合計が200以上の場合、1日目を(+)とし、2日とも検査値を表記しています。</td> </tr> <tr> <td>判定不能</td> <td colspan="2">採便方法が不適合等の理由で検査ができなかった場合</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)検診機関によって、判定基準・区分が異なります。詳しくは、検診実施機関にお尋ねください。</p> | 便潜血検査結果 (ng/ml)  |        | (-)    | 検査値が150以下の場合には(-)と表示し、検査値は表記していません。 | (+)        | 検査値が151以上の場合には(+)と表示し、検査値を表記しています。 | 判定区分 | 便潜血検査結果 (ng/ml) |            | 1日目   | 2日目 | 異常認めず1 | (-)           | (-)       | 異常認めず2 | (-)   | 検体なし | 要観察      | 結果が2日とも(-)で、問診の内容により医師が必要と認めた場合 |       | 要精密検査  | 結果が1日または2日とも(+)の場合<br>(注)検査値が2日とも150以下でも2日間の合計が200以上の場合、1日目を(+)とし、2日とも検査値を表記しています。 |       | 判定不能 | 採便方法が不適合等の理由で検査ができなかった場合 |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 便潜血検査結果 (ng/ml)  |   |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| (-)              | 検査値が150以下の場合には(-)と表示し、検査値は表記していません。   |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| (+)              | 検査値が151以上の場合には(+)と表示し、検査値を表記しています。  |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 判定区分             | 便潜血検査結果 (ng/ml)   |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
|                  | 1日目   | 2日目  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 異常認めず1           | (-)   | (-)  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 異常認めず2           | (-)   | 検体なし   |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 要観察              | 結果が2日とも(-)で、問診の内容により医師が必要と認めた場合   |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 要精密検査            | 結果が1日または2日とも(+)の場合<br>(注)検査値が2日とも150以下でも2日間の合計が200以上の場合、1日目を(+)とし、2日とも検査値を表記しています。  |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 判定不能             | 採便方法が不適合等の理由で検査ができなかった場合  |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 肝炎<br>ウイルス<br>検診 | <p>血液検査で、C型肝炎ウイルス、B型肝炎ウイルスに感染していないかを調べます。<br/>陽性の場合、「現在、肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」状態をいい、陰性の場合、「現在、肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」状態をいいます。<br/>ウイルス性肝炎になると急性肝炎として一時的に発症し自然に治るものと、慢性肝炎から肝硬変や肝がんへと移行するものがあります。「現在、肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定された場合は、かかりつけの内科など医療機関を受診し、相談してください。</p> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">B型肝炎ウイルス検査</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>判定区分</th> <th>HBs抗原検査 (IU/ml)</th> </tr> <tr> <td>陰性</td> <td>0.0049以下</td> </tr> <tr> <td>陽性</td> <td>0.0050以上</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th colspan="3">C型肝炎ウイルス検査</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>判定区分</th> <th>HCV抗体検査 (COI)</th> <th>HCV-RNA検査</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">陰性</td> <td>0.9以下</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.0~49.9</td> <td style="text-align: center;">陰性</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">陽性</td> <td>50.0以上</td> <td style="text-align: center;">陽性</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)HCV抗体検査の値が1.0~49.9の方にHCV-RNA検査を実施しています。</p>   | B型肝炎ウイルス検査   |        | 判定区分   | HBs抗原検査 (IU/ml)                     | 陰性         | 0.0049以下                           | 陽性   | 0.0050以上        | C型肝炎ウイルス検査 |       |     | 判定区分   | HCV抗体検査 (COI) | HCV-RNA検査 | 陰性     | 0.9以下 |      | 1.0~49.9 | 陰性                              | 陽性    | 50.0以上 | 陽性   |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| B型肝炎ウイルス検査       |   |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 判定区分             | HBs抗原検査 (IU/ml)   |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 陰性               | 0.0049以下  |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 陽性               | 0.0050以上  |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| C型肝炎ウイルス検査       |   |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 判定区分             | HCV抗体検査 (COI)   | HCV-RNA検査  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 陰性               | 0.9以下   |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
|                  | 1.0~49.9  | 陰性   |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 陽性               | 50.0以上  | 陽性   |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
|                  | 前立<br>腺<br>検診   | <p>血液中のPSA(前立腺特異抗原)を検査し、前立腺がんなど前立腺の疾患の可能性を調べます。<br/>この検診で異常が認められた場合は、泌尿器科を受診し精密検査を受けてください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>判定区分</th> <th>年齢</th> <th>PSA(ng/ml)</th> <th>問診項目</th> <th>判定区分</th> <th>年齢</th> <th>PSA(ng/ml)</th> <th>問診項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異常認めず</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td>1.9以下</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td rowspan="4">要精密検査2</td> <td>49才以下</td> <td>2.0以上</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>要観察1</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td>1.9以下</td> <td>自覚症状あり</td> <td>50~64才</td> <td>3.0以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">要観察2</td> <td>50~64才</td> <td>2.0~2.9</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">—</td> <td>65~69才</td> <td>3.5以上</td> </tr> <tr> <td>65~69才</td> <td>2.0~3.4</td> <td>70才以上</td> <td>4.0以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">要精密検査1</td> <td>70才以上</td> <td>2.0~3.9</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">血尿あり</td> <td colspan="3">要継続医療 前立腺がんで治療中の場合</td> </tr> <tr> <td>49才以下</td> <td>1.9以下</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50~64才</td> <td>2.9以下</td> <td></td> </tr> <tr> <td>65~69才</td> <td>3.4以下</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>70才以上</td> <td>3.9以下</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 判定区分   | 年齢     | PSA(ng/ml)                          | 問診項目       | 判定区分                               | 年齢   | PSA(ng/ml)      | 問診項目       | 異常認めず | —   | 1.9以下  | —             | 要精密検査2    | 49才以下  | 2.0以上 | —    | 要観察1     | —                               | 1.9以下 | 自覚症状あり | 50~64才   | 3.0以上 | 要観察2 | 50~64才                   | 2.0~2.9 | — | 65~69才 | 3.5以上 | 65~69才 | 2.0~3.4 | 70才以上 | 4.0以上 | 要精密検査1 | 70才以上 | 2.0~3.9 | 血尿あり | 要継続医療 前立腺がんで治療中の場合 |  |  | 49才以下 | 1.9以下 |  | 50~64才 | 2.9以下 |  | 65~69才 | 3.4以下 |  |  | 70才以上 | 3.9以下 |  |
| 判定区分             | 年齢  | PSA(ng/ml)   | 問診項目   | 判定区分   | 年齢                                  | PSA(ng/ml) | 問診項目                               |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 異常認めず            | —   | 1.9以下  | —      | 要精密検査2 | 49才以下                               | 2.0以上      | —                                  |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 要観察1             | —   | 1.9以下  | 自覚症状あり |        | 50~64才                              | 3.0以上      |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 要観察2             | 50~64才  | 2.0~2.9  | —      |        | 65~69才                              | 3.5以上      |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
|                  | 65~69才  | 2.0~3.4  |        |        | 70才以上                               | 4.0以上      |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 要精密検査1           | 70才以上   | 2.0~3.9  |        | 血尿あり   | 要継続医療 前立腺がんで治療中の場合                  |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
|                  | 49才以下   | 1.9以下  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
|                  | 50~64才  | 2.9以下  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
|                  | 65~69才  | 3.4以下  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
|                  | 70才以上   | 3.9以下  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |
| 腹部<br>超音波<br>検査  | 腹部に超音波をあて、肝臓・胆のう・腎臓・脾臓など腹腔内の臓器から返ってくるエコー(反射波)を画像として映し出し、病変を調べます。この検診で異常が認められた場合は、内科など医療機関で精密検査を受けてください。   |  |        |        |                                     |            |                                    |      |                 |            |       |     |        |               |           |        |       |      |          |                                 |       |        |  |       |      |                          |         |   |        |       |        |         |       |       |        |       |         |      |                    |  |  |       |       |  |        |       |  |        |       |  |  |       |       |  |

| 胃の健康度チェック (ABC検診)   | <p>血液検査で、胃がんのリスク(かかりやすさ)を調べる検査です。胃の萎縮度を調べるペプシノゲン検査とピロリ菌の有無を調べるヘリコバクターピロリ抗体検査の結果を合わせて3つのタイプ(ABC)に分類します。<br/>         検診結果がBまたはC判定の方は、医療機関で精密検査(バリウム検査・内視鏡検査等)を受けてください。また、自覚症状が気になる場合は必ず消化器科を受診してください。</p>  |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|---|---|---|----------------------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---|----------------------------|-----------|----------------------------|------------|-------------|-----------|---|------|-------|---------|------|---------------------------------|----|--|-------|---------------------------|---|-----|---------|------|-------|---------|------|------|---------|------|-------|------|---|--|--|--|--|-------|---------------|--|
|   | <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">検査項目</th> <th colspan="2">ヘリコバクターピロリ抗体検査</th> </tr> <tr> <th>陰性(-)</th> <th>陽性(+)</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">ペプシノゲン検査</td> <td>陰性(-)</td> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>陽性(+)</td> <td colspan="2">C</td> </tr> </table>  |   | 検査項目                       | ヘリコバクターピロリ抗体検査  |   | 陰性(-)           | 陽性(+)          | ペプシノゲン検査  | 陰性(-)                      | A         | B                          | 陽性(+)      | C           |           | <table border="1"> <tr> <th>分類</th> <th>胃の健康度</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>健康的な胃粘膜です。胃の病気になる危険性は低いと考えられます。</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>少し弱った胃粘膜です。ピロリ菌に感染している可能性が高く、胃潰瘍・十二指腸潰瘍などに注意しましょう。</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>弱った胃粘膜です。胃の病気になる可能性があります。</td> </tr> </table> |      | 分類    | 胃の健康度   | A    | 健康的な胃粘膜です。胃の病気になる危険性は低いと考えられます。 | B  | 少し弱った胃粘膜です。ピロリ菌に感染している可能性が高く、胃潰瘍・十二指腸潰瘍などに注意しましょう。 | C     | 弱った胃粘膜です。胃の病気になる可能性があります。 |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 検査項目  | ヘリコバクターピロリ抗体検査  |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   | 陰性(-)   | 陽性(+)   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| ペプシノゲン検査  | 陰性(-)   | A   | B                          |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   | 陽性(+)   | C   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 分類  | 胃の健康度   |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| A   | 健康的な胃粘膜です。胃の病気になる危険性は低いと考えられます。   |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| B   | 少し弱った胃粘膜です。ピロリ菌に感染している可能性が高く、胃潰瘍・十二指腸潰瘍などに注意しましょう。  |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| C   | 弱った胃粘膜です。胃の病気になる可能性があります。   |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| <p>(注) 1.胃がんのリスクを調べる検査です。バリウム検査や内視鏡検査の代わりとなる検査ではありません。従来から実施している胃部検診(バリウム検査)も受診しましょう。<br/>         2.ピロリ菌の除菌については、医療機関にご相談ください。</p> |   |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 骨粗しょう症検診  | <p>踵骨(足のかかと)に超音波をあてて骨の強さ(ステフネス)を測定し、骨粗しょう症を調べます。この検診で異常が認められた場合は、整形外科を受診し、精密検査を受けてください。骨量は加齢とともに減少します。指標として、骨が最も強い年代(20才の人)との比較(%)を表記していますが、判定には含まれていません。</p>   |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>判定区分</th> <th>性別・年齢別</th> <th>骨の強さの指標(ステフネス)</th> <th>同年齢との比較(%)</th> <th>判定区分</th> <th>性別・年齢別</th> <th>骨の強さの指標(ステフネス)</th> <th>同年齢との比較(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">異常認めず</td> <td>男性</td> <td>68以上</td> <td rowspan="2">90以上</td> <td rowspan="4">要精密検査</td> <td>男 49才以下</td> <td>68以上</td> <td>79以下</td> </tr> <tr> <td>女性</td> <td>62以上</td> <td>女性 全員</td> <td>67以下</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">要観察</td> <td>男 49才以下</td> <td rowspan="2">68以上</td> <td>80~89</td> <td>女 49才以下</td> <td rowspan="2">62以上</td> <td rowspan="2">79以下</td> </tr> <tr> <td>女 50才以上</td> <td>89以下</td> <td>女性 全員</td> <td>61以下</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>要継続医療</td> <td colspan="3">骨粗しょう症で治療中の場合</td> </tr> </tbody> </table> |   |                            |                 | 判定区分  | 性別・年齢別          | 骨の強さの指標(ステフネス) | 同年齢との比較(%)  | 判定区分                       | 性別・年齢別    | 骨の強さの指標(ステフネス)             | 同年齢との比較(%) | 異常認めず       | 男性        | 68以上  | 90以上 | 要精密検査 | 男 49才以下 | 68以上 | 79以下                            | 女性 | 62以上   | 女性 全員 | 67以下                      | — | 要観察 | 男 49才以下 | 68以上 | 80~89 | 女 49才以下 | 62以上 | 79以下 | 女 50才以上 | 89以下 | 女性 全員 | 61以下 | — |  |  |  |  | 要継続医療 | 骨粗しょう症で治療中の場合 |  |
| 判定区分  | 性別・年齢別  | 骨の強さの指標(ステフネス)  | 同年齢との比較(%)                 | 判定区分            | 性別・年齢別  | 骨の強さの指標(ステフネス)  | 同年齢との比較(%)     |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 異常認めず   | 男性  | 68以上  | 90以上                       | 要精密検査           | 男 49才以下   | 68以上            | 79以下           |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   | 女性  | 62以上  |                            |                 | 女性 全員   | 67以下            | —              |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 要観察   | 男 49才以下   | 68以上  | 80~89                      |                 | 女 49才以下   | 62以上            | 79以下           |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   | 女 50才以上   |   | 89以下                       |                 | 女性 全員   |                 |                | 61以下  | —                          |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   |   |   |                            | 要継続医療           | 骨粗しょう症で治療中の場合   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 血液追加検査  | 白血球   | <p>体内に侵入した細菌・ウイルス・異物などから体を守る免疫の働きを担う血球です。高値では感染症や血液疾患等が疑われます。</p>   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>性別</th> <th>基準値(×100/ul)</th> <th>基準値範囲外(×100/ul)</th> <th>判定表示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>男性</td> <td>38~98</td> <td>37以下・99以上</td> <td rowspan="2">低値の場合「L」、高値の場合「H」を表記しています。</td> </tr> <tr> <td>女性</td> <td>35~91</td> <td>34以下・92以上</td> </tr> </tbody> </table> |                            | 性別              | 基準値(×100/ul)  | 基準値範囲外(×100/ul) | 判定表示           | 男性  | 38~98                      | 37以下・99以上 | 低値の場合「L」、高値の場合「H」を表記しています。 | 女性         | 35~91       | 34以下・92以上 |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 性別  | 基準値(×100/ul)  | 基準値範囲外(×100/ul)   | 判定表示                       |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 男性  | 38~98   | 37以下・99以上   | 低値の場合「L」、高値の場合「H」を表記しています。 |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 女性  | 35~91   | 34以下・92以上   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 血液追加検査  | 血小板   | <p>血液が固まるときに重要な役割をする血球です。低値では血液疾患や肝臓疾患が疑われます。</p>   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準値(万/ul)</th> <th>基準値範囲外(万/ul)</th> <th>判定表示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.0~35.0</td> <td>13.9以下・35.1以上</td> <td>低値の場合「L」、高値の場合「H」を表記しています。</td> </tr> </tbody> </table>  |                            | 基準値(万/ul)       | 基準値範囲外(万/ul)  | 判定表示            | 14.0~35.0      | 13.9以下・35.1以上   | 低値の場合「L」、高値の場合「H」を表記しています。 |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 基準値(万/ul)   | 基準値範囲外(万/ul)  | 判定表示  |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 14.0~35.0   | 13.9以下・35.1以上   | 低値の場合「L」、高値の場合「H」を表記しています。  |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 血液追加検査  | ALB   | <p>ALB(アルブミン)は、肝臓で合成され、血液中に最も多い蛋白です。低値では栄養不足や肝臓・腎臓疾患が疑われます。</p>   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準値(g/dl)</th> <th>基準値範囲外(g/dl)</th> <th>判定表示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.8~5.3</td> <td>3.7以下・5.4以上</td> <td>低値の場合「L」、高値の場合「H」を表記しています。</td> </tr> </tbody> </table>  |                            | 基準値(g/dl)       | 基準値範囲外(g/dl)  | 判定表示            | 3.8~5.3        | 3.7以下・5.4以上   | 低値の場合「L」、高値の場合「H」を表記しています。 |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 基準値(g/dl)   | 基準値範囲外(g/dl)  | 判定表示  |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 3.8~5.3   | 3.7以下・5.4以上   | 低値の場合「L」、高値の場合「H」を表記しています。  |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 腫瘍マーカー検査  | <p>AFP 主に肝臓がんで上昇します。肝硬変・肝炎・胃がん・膵臓がん・大腸がんなどでも高くなる場合があります。また、妊娠時に高くなる場合もあります。</p>   |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   | <p>CEA 大腸がんをはじめ消化器系のがんや膵臓がん、肺がんで上昇します。肝硬変・肝炎・腎不全などでも高くなる場合があります。また、加齢や喫煙で高くなる場合もあります。</p>   |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 腫瘍マーカー検査  | <p>CYFRA(シフラ) 肺がん(扁平上皮がんや腺がん)で上昇します。乳がん、卵巣がんなどでも高くなる場合があります。</p>  |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   | <p>CA19-9 卵巣がん・大腸がん・膵臓がん・胆のうがんで上昇します。子宮内膜症・子宮筋腫・胃がん・胆道がんなどでも高くなる場合があります。</p>  |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 腫瘍マーカー検査  | <p>CA125 卵巣がんで上昇します。乳がん・肺がん・肝臓がんなどでも高くなる場合があります。また、月経期や妊娠時に高くなる場合もあります。</p>   |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   | <p>CA15-3 主に乳がんで上昇します。子宮内膜症・肝炎などでも高くなる場合があります。</p>  |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| <p>(注)腫瘍マーカーが高い値(↑)を示した場合は、必ず医療機関を受診してください。</p>   |   |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 甲状腺機能検査   | <p>血液検査で、甲状腺機能を調べる検査です。要精密検査の場合は、必ず医療機関を受診してください。</p>   |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   | <table border="1"> <tr> <td>TSH (甲状腺刺激ホルモン)</td> <td colspan="2">脳(下垂体前葉)から分泌されるホルモンで、甲状腺に働きかけて甲状腺ホルモンの分泌に関与します。分泌量が多ければ、甲状腺機能低下症が疑われ、少なければ甲状腺機能亢進症が疑われます。</td> </tr> <tr> <td>FT4 (遊離サイロキシン)</td> <td colspan="2">甲状腺から分泌されるホルモンで、体の新陳代謝に関与します。分泌量が多ければ、甲状腺機能亢進症が疑われ、少なければ甲状腺機能低下症が疑われます。</td> </tr> </table>  |   |                            | TSH (甲状腺刺激ホルモン) | 脳(下垂体前葉)から分泌されるホルモンで、甲状腺に働きかけて甲状腺ホルモンの分泌に関与します。分泌量が多ければ、甲状腺機能低下症が疑われ、少なければ甲状腺機能亢進症が疑われます。 |                 | FT4 (遊離サイロキシン) | 甲状腺から分泌されるホルモンで、体の新陳代謝に関与します。分泌量が多ければ、甲状腺機能亢進症が疑われ、少なければ甲状腺機能低下症が疑われます。 |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| TSH (甲状腺刺激ホルモン)   | 脳(下垂体前葉)から分泌されるホルモンで、甲状腺に働きかけて甲状腺ホルモンの分泌に関与します。分泌量が多ければ、甲状腺機能低下症が疑われ、少なければ甲状腺機能亢進症が疑われます。   |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| FT4 (遊離サイロキシン)  | 甲状腺から分泌されるホルモンで、体の新陳代謝に関与します。分泌量が多ければ、甲状腺機能亢進症が疑われ、少なければ甲状腺機能低下症が疑われます。   |   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 甲状腺機能検査   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">検査項目</th> <th colspan="2">FT4(ng/dl)</th> </tr> <tr> <th>0.8~1.7</th> <th>0.7以下・1.8以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TSH (μIU/ml)</td> <td>0.5~4.3</td> <td>異常認めず</td> <td rowspan="2">要精密検査</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.4以下・4.4以上</td> <td>要観察</td> </tr> </tbody> </table>  |   | 検査項目                       | FT4(ng/dl)      |   | 0.8~1.7         | 0.7以下・1.8以上    | TSH (μIU/ml)  | 0.5~4.3                    | 異常認めず     | 要精密検査                      |            | 0.4以下・4.4以上 | 要観察       | <p>要継続医療 現在、甲状腺疾患で治療を受けておられます。引き続き主治医の指示に従ってください。</p>   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   | 検査項目  | FT4(ng/dl)  |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| 0.8~1.7   |   | 0.7以下・1.8以上   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
| TSH (μIU/ml)  | 0.5~4.3   | 異常認めず   | 要精密検査                      |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |
|   | 0.4以下・4.4以上   | 要観察   |                            |                 |   |                 |                |   |                            |           |                            |            |             |           |   |      |       |         |      |                                 |    |  |       |                           |   |     |         |      |       |         |      |      |         |      |       |      |   |  |  |  |  |       |               |  |